

Fieberunterdrückende Mittel.

(Antipyretica, Antithermica.)



Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde

aus der

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

unter dem Präsidium

des Herrn Geheim-Rath Professor

Dr. von Gietl

der medicinischen Facultät

in München


vorgelegt

von

Sigmund Grünberg,

Doctoranden der Medicin

aus Prasnisch in Polen.



München 1879.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Fieberunterdrückende Mittel.

(Antipyretica, Antithermica.)

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde

aus der

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

unter dem Präsidium

des Herrn Geheim-Rath Professor

Dr. von Gietl

der medicinischen Facultät

in München

vorgelegt

von

Sigmund Grünberg,

Doctoranden der Medicin

aus Prasnisch in Polen.



München 1879.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41554610_0116

Der Symptomencomplex «Fieber» kennzeichnet sich vorzugsweise durch Erhöhung der Eigenwärme des Gesamtkörpers. Diese Erhöhung kann bedingt sein durch ungenügenden Abfluss der normalen Wärme, oder durch Steigerung der Wärmeproduction im Innern des Organismus — eventuell durch ein Zusammenfallen dieser beiden Momente.

Die Therapie hat demnach vor allem folgende Aufgaben:

- 1) Die Abfuhr der Wärme nach Außen zu fördern.
- 2) Die Production der Wärme im Innern einzudämmen.

Der ersten Indication entspricht meines Wissens am besten die äußerlich angewendete:

Kälte. Dieses Agens war schon im Alterthum bekannt, als eines der besten Mittel gegen fieberhafte Erscheinungen. Anfangs wandte man die Kälte nur in Form kalter Begießungen und Bespritzungen an, späterhin wurden auch kalte Wafchungen und Bäder gebraucht, wobei dieses ganze Heilsystem den Namen «Psychrolusia» erhielt (von «ψυχρος» und «λούω»).

Interessant ist die Methode von *Galen*, welcher an hectisches Fieber Leidende, zuerst mit warmem Oel begießen, dann aber in kaltes Wasser eintauchen ließ, was

*Aetius*¹⁾ (543) mit folgenden Worten berichtet: «Deferatur aeger ad balneum, praeparata sindone calida in ipsa gestetur. Sint autem quatuor qui sindonem teneant in singulis angulis unus, deindae toto corpore oleo tepido dulcissimo perfusus in solum locetur nulla corporis perfusione fieutae. Hinc extractus in frigidam aquam confestim mergatur, ne minimum quidem morae in ipsa trahens. Demissus in lectum mollibus linteis lenissime detergetur.» — *Aetius* selbst empfiehlt auch kalte Begießungen: «aestate in ardentissimis febribus frigidam adspersionem adhibemus,» aber nur bei brennendem Fieber und nicht zu niedriger Lufttemperatur. *Avicenna*²⁾ sagt: «Faciem vero madefacere et super ipsam aqua rorare, virtutem vivicat, quum est laxala et inflammationi febrium etcet.»

Den mystificirenden und Wunderfuchenden Aerzten des Mittelalters konnte das reine kalte Wasser schon deshalb nicht genügen, weil es zu einfach war. Mußte doch damals jedes Heilmittel möglichst complicirt fein, sonst wäre es ja nicht fähig, die verborgenen Kräfte zu entwickeln!

Noch *Thurneysser* zum *Thurn*³⁾ der Verfasser der ersten deutschen Balneologie, will das kalte Wasser gänzlich aus der Therapie verbannt wissen; weil es im Gegensatz zu den mineralischen Wässern, über deren Wirkung er sich enthusiastisch ausspricht, unter allen Umständen schädlich sei.

¹⁾ Aetii, tetrabiblos, Ed. Froben. Basilea 1542. I. Sermo. III. cap.

²⁾ Avicennae. Canon medicinae. Venetus apud Juntas 1595.

³⁾ Thurneysser zum Thurn. Zehn Bücher von kalten warmen mineralischen und metallischen Wässern, sammt deren Vergleichung mit den Plantis oder Erdgewachsen. Straßburg 1612 Bch. I Cp. 7. Pag. 8.

Erst der schlesische Arzt *Sigmund Hahn*¹⁾ (1662—1742) befürwortete wieder die Kaltwasserbehandlung in fieberhaften Krankheiten, namentlich in adynamischen Formen derselben, ohne jedoch großen Anklang gefunden zu haben, wenigstens in der ersten Zeit, standen ihm nur seine beiden Söhne zur Seite (Bogumir und Johann Sigmund 1696—1772).

Die günstige Wirkung des kalten Wassers gegen schwere Fieberfälle beobachtete ganz zufällig *Unsenius*. Als nämlich unter der Mannschaft eines am baltischen Meer segelnden Schiffes eine typhoide Epidemie ausbrach, sah er, daß diejenigen Patienten, welchen es gelang, ins Wasser zu springen, die aber aus diesem noch früh genug aufgefischt wurden, durchwegs genasen, während von den besser bewachten, alle ohne Ausnahme starben.

Den größten Schwung gab jedoch der Kaltwasserbehandlung in fieberhaften Krankheiten der Engländer *William Wright* (1777). Schon als ärztlicher Dirigent des militärischen Lazarets in Barbadoes, hatte er oft Gelegenheit die günstige Wirkung der äußerlich angewendeten Kälte gegen das Schiffsfieber (Typhus?) Gelbesfieber etc. zu beobachten. Als er zuletzt selbst an Fleckfieber erkrankte, versuchte er zum ersten Male allgemeine kalte Begießungen an sich selbst. Die Erfolge waren so überraschend günstig, daß er sich veranlaßt sah, gleich darauf (1779) seine Beobachtungen dem ärztlichen Verein in London vorzulegen.

Damit nicht zufrieden, stellte er später noch weitere Verfuche in Edinbourg an und gelangte durch diese

¹⁾ Cf. Oertel. Von der wunderbaren Heilkraft des frischen Wassers. Ilmenau 1831.

zur Ueberzeugung, daß das kalte Wasser nicht nur das beste Heilmittel gegen bereits ausgebrochenes Fieber, sondern auch ein mächtiges Prophylacticum gegen dasselbe sei. Seine Mittheilungen bewogen den bedeutenden Arzt *James Currie* in Liverpool zu derselben Therapie. Er wendete während 5 Jahren kalte Begießungen in 212 Fällen an, und gelangte schließlicb zu derselben Ueberzeugung wie *Wright*, nämlich, daß das kalte Wasser beim Typhus und anderen Fiebern von ausgezeichneter, ja gerade auf anderem Wege unerreichbarer Wirkung ist. Die Beobachtungen von *Currie* waren aber um so mehr maßgebend, als er die Erfolge seiner Therapie durch calorimetrische Data beleuchtete, somit also der erste war, welcher den Einfluß der Kälte auf die Körpertemperatur in exacter Weise feststellte.

Fast gleichzeitig wurde auch in Deutschland und Oesterreich die Kaltwasserbehandlung gegen fieberhafte Zustände in Anwendung gezogen. So fand *Hubertus* in Wien (1804) das kalte Wasser sehr wirksam gegen Scharlach, *Kolbany* in Preßburg (1808) gegen Fleckfieber. Es konnte jedoch diese Therapie anfangs auf deutschem Boden keine festen Wurzeln schlagen. Ja es gab sogar dann wieder eine Zeit, wo man dem kalten Wasser nur mehr antiphlogistische, nicht aber zugleich auch antipyretische Wirkung zuschrieb.

Erst *Brand*¹⁾ verschaffte diesem einfachen und dennoch so wirksamen Mittel wieder die früheren Bürgerrechte in der Therapie der fieberhaften Krankheiten. Seinem Bei-

¹⁾ Brand. Die Hydrotherapie des Typhus. Stettin 1861.

spiele folgten *Jürgensen*,¹⁾ *Liebermeister*²⁾ und *Hagenbach*, so wie beinahe alle anderen deutschen Kliniker.

Liebermeister gelangt auf Grund seiner zahlreichen Beobachtungen zu dem Schlusse, dafs der Fiebernde im Bade mehr Wärme verliert als sonst; da aber nach *Liebermeisters* Theorie die Wärmeproduction desto gröfser ist, je gröfser der Wärmeverlust, so ist demnach die allgemeine Körperwärme während des Bades eher gesteigert, als vermindert. Unmittelbar aber nach dem Bade sinkt die Körperwärme, weil durch eine Nachwirkung die Production verringert wird. Es sind somit nach *L.* die kalten Bäder nicht nur unschädlich, sondern im Gegentheil sehr angezeigt, denn die momentane Steigerung der Wärmeproduction kommt nicht in Betracht, angesichts der späteren Reduction derselben.

Je kühler das Bad, desto gröfser ist der Wärmeabfluss und damit auch das spätere Sinken der allgemeinen Körpertemperatur. Ebenso verhält es sich mit der Dauer des Bades. Ein länger dauerndes Bad nimmt dem Körper viel mehr Wärme ab, als ein kurzes derselben Temperatur. Andererseits wirkt ein kurzes, aber kühleres Bad energischer antipyretisch, als ein längeres aber zugleich auch wärmeres.

*Senator*³⁾ und *Jürgensen*⁴⁾ wollten anfangs den ersten Theil des *Liebermeister'schen* Satzes nicht anerkennen, da

¹⁾ *Jürgensen*. Klinische Studien über die Behandlung des Typhus. abdom. Lpzg. 1866.

²⁾ *Liebermeister* und *Hagenbach*. Aus der med. Klinik zu Basel. Lpzg. 1868.

³⁾ *Senator*. Untersuchungen über den fieberhaften Process. 1873.

⁴⁾ *Jürgensen*. Deutsches Archiv für klinische Medicin 4. Band.

sie eine Steigerung der Wärmeproduction während des Bades nicht constatiren konnten. Späterhin stimmten sie aber auch in dieser Hinsicht vollkommen mit *Liebermeister* überein, während sie die Indication der kalten Bäder im Fieber von vorneherein acceptirten. *Jürgensen* räth, recht kalte Bäder und Begießungen (bis 10° R.). *Senator* meint fogar, man solle eine bedeutende Hautpartie des Fiebernden vor dem Bade mit Sinapismen belegen, um dadurch einen größeren Abfluß der Wärme zu gewinnen, deren Zurückhaltung er (mit Traube) als Urfache des Fiebers betrachtet. Jedenfalls eine bedenkliche Therapie!

*Riegel*¹⁾ glaubt gegen den Theil der Liebermeister'schen Theorie auftreten zu müssen, nach welchem der Nutzeffect der Bäder von deren Temperatur abhängig sei. Nach seiner Ansicht kommt es darauf nicht an, ob das Bad etwas kühler oder wärmer ist, jedoch läßt er in der Pause zwischen den einzelnen Bädern, «um die Wirkung nachhaltiger zu machen,» Brust und Unterleib des Patienten mit kalten Tüchern, ja fogar mit Eisbeuteln bedecken.

Professur *Ziemssen*²⁾ verordnet nicht ganz kalte, sondern gradatim abgekühlte Bäder, oder auch kalte Begießungen im lauwarmen Bade. *Leube*³⁾ kühlt seine Kranken mittelst großer Eiskissen ab.

¹⁾ Riegl. Deutsches Archiv für klinische Medicin 9. Band. «Ueber Wärmeregul und Hydrotherapie.»

²⁾ Professor Ziemssen und Immermann. »Die Kaltwasserbehandlung d. Typh. abdom.«

³⁾ Leube. Die Abkühlung Kranker mit Eiskissen. Deutsch Archiv f. klin. Medicin. 8. Bd

*Czerwinski*¹⁾ ist der Meinung, daß die Temperatur des gegen fieberhafte Affectionen angewendeten Bades sich nicht erheblich von der Körpertemperatur unterscheiden darf. Im Fieber — sagt er — handelt es sich vor allem um Beruhigung der Nerven, es sind deshalb energische Kältegrade contra-indicirt.

Um die zweite von den oben angegebenen Indicationen zu erfüllen, d. h. um die Production der Wärme im Innern zu beschränken, bedienen wir uns folgender Mittel:

Chinin. Unter den antipyreticis spielt neben der Kälte unftreitig das Chinin die wichtigste Rolle. Seine specifische Wirkung in der Malariainfection, ist noch nicht genügend aufgeklärt, scheint jedoch auf Hemmung der Gährungsvorgänge — Zerstörung niederer Organismen — zu beruhen (*Binz*). Von der Temperatur herabsetzenden Eigenschaft dieses Alkaloides wußten bereits *Jochmann*²⁾ und *Dietl*³⁾. Dieser letztere pflegte in seiner Klinik zu Krakau, täglich 30—40 Gran (2—6 grm.) des schwefelfauren Chinins zu verordnen, ohne irgend welchen Schaden bemerkt zu haben. Zahlreiche Beobachtungen über den Werth des Chinins bei Typh. abdom. stellte erst im Jahre 1859 *Vogt*⁴⁾ in Bern an. An dieselben reihen sich dann die Aufsätze von *Wachs-*

¹⁾ *Czerwinski*. Compendium der Thermotheapie. Wien 1875

²⁾ *Jochmann*. Beobachtungen über die Körperwärme in chronischen Krankheiten 1853.

³⁾ *Dietl*. Wirkungen des Chinins 1856.

⁴⁾ *Vogt*. Die fieberunterdrückende Methode 1859. (Schweizerische Monatsblätter.)

*muth*¹⁾ und *Liebermeister*²⁾ in würdiger Weise an. Die Ansichten des letzteren bildeten einen Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen, unter denen namentlich die von *Jürgensen*³⁾ beachtenswerth sind.

Jürgensen gelangte auf Grund einer colossalen Reihe von Experimenten zu folgenden Schlüssen: 1. Beim gefunden Menschen wirkt das Chinin auf die Körpertemperatur nicht erniedrigend, es verleiht lediglich ihrem Tagesverlaufe die Tendenz zur Bildung einer geraden Linie, d. h. es verringert die Tageschwankungen der Körperwärme; 2. angestrengte Muskelarbeit hebt die Körperwärme nicht so bedeutend, wenn dem betreffenden Individuum vorher Chinin gereicht wurde.

Bei gefunden Thieren dagegen sinkt die Körpertemperatur nach mäßigen Chiningaben immer. Es bewiesen dies *Binz*⁴⁾, *Seegal*⁵⁾ und *Levicki*⁶⁾.

Die Frequenz der Pulschläge wird durch Chinin verringert, jedoch ist diese Verlangsamung nicht synchronisch mit dem Temperaturabfall, scheint überhaupt von letzterem in keiner Weise abhängig zu sein. Es kommt im Gegentheile nicht selten vor, daß die Körperwärme sinkt, während der Puls unverändert bleibt, ja sogar frequenter erscheint.

¹⁾ Wachsmuth. Typhus ohne Fieber? Archiv f. Heilkunde 1863.

²⁾ Liebermeister. Ueber die antipyretische Wirkung des Chinins. Deutsch. Archv. f. klin. Medicin. 1867.

³⁾ Jürgensen. Die Körperwärme des gefunden Menschen.

⁴⁾ Binz. Virchow's Archiv Bd. 46.

⁵⁾ Seegal. Centralbl. f. die med. Wissenschaft, 1869.

⁶⁾ Levicki. Ueber den Einfl. des Chinins auf die Temper. etc, Virchow's. Archv. Bd. 47.

*Block*¹⁾ hat bei Thieren gefunden, daß kleine Chinindosen zwar einen Abfall der Temperatur, gleichzeitig aber eine Vermehrung der Pulschläge bewirkten. Erst bei größeren Dosen hielt die Pulsfrequenz mit dem Temperaturabfall ziemlich gleichen Schritt.

Wenn endlich tödtliche Gaben verabreicht wurden, so steigerte sich die Zahl der Pulschläge immer mehr, bis eine plötzliche Sistirung derselben eintrat. Diese Experimente nöthigen *Block* zu dem Schlusse, daß die veränderte Herzthätigkeit nicht von einer Verminderung der Wärme-production abhängt, und auf die letztere auch die Herz-action keinen Einfluß hat. Das Chinin soll vielmehr eine zweifache Wirkung haben, indem es einerseits die Herz-action beschleunigt, anderseits die Wärmebildung herabsetzt.

*Janßen*²⁾ theilt vollkommen die Anschauungen *Blocks*, behauptet aber außerdem, daß der ganze Stoffumsatz unter dem Einflusse des Chinins schneller von Statten geht. Er stützt sich in dieser Hinsicht auf Experimente, die er an jungen Hühnern anstellte, dagegen sprechen aber die Untersuchungen, die er an sich selbst vornahm, sowie auch die Mittheilungen von *Ranke*³⁾, *Boffe*⁴⁾ und *Unruh*⁵⁾. Es

¹⁾ *Block*. Ueber den Einfluß des Chinins auf Temperatur und Herzaction. Dissertation Göttingen 1870.

²⁾ *Janßen*. Ueber Einfluß des Schwefels. Chinins auf Körperwärme und Stoffumsatz. Differt. Dorpat. 1872.

³⁾ *Ranke*. Beobachtungen und Versuche über Harnsäure-Ausscheidung beim Menschen. 1858.

⁴⁾ *Boffe*. Stickstoffausscheidungen bei fieberhaften Krankheiten *Virchw. Archv.* 1869.

⁵⁾ *Unruh*. Ueber den Einfluß von Arzneimitteln auf Ausscheidung der Harnsäure. Dorpat. 1862.

steht somit fest, daß beim gefundenen Menschen das Chinin den Stoffumsatz herabsetzt.

Wie soll man nun die Temperatur herabsetzende Wirkung des Chinins beim Fiebernden erklären? *Clarus* meint, dieselbe sei auf durch das Alkaloid hervorgerufene Veränderungen im Sympaticus und Vagus zu beziehen. *Schlofskow*¹⁾ und *Hirsch*²⁾ glauben, das Chinin erzeuge besondere Wärmecentren. *Ladendorf*³⁾ endlich spricht die Meinung aus, es liege hier eine directe Wirkung auf das Blut vor.

Diese letzte Ansicht scheint die größte Wahrscheinlichkeit für sich zu haben. Wenigstens sprechen ihr *Manassein*⁴⁾ und *Binz*⁵⁾ entschieden das Wort. *Manassein* erklärt die Wirkung des Chinins gegen Fieber daraus, daß es den Sauerstoff fester an das Haemoglobin der Blutkörperchen bindet und dadurch die Oxydation der Gewebe erschwert. *Binz* sagt: «Was man Specificität nennt, ist wohl nur eine stärkere chemische Affinität zu dem einen oder anderen fiebererregenden Gift» und an einer anderen Stelle: «Der von Chinin so vielfach bewirkte Temperaturabfall im Fieber kommt unabhängig vom Herzen, so wie von den Theilen des Nervensystems zu Stande, welche dem Gehirn angehören.»

Die durch das Chinin erreichbare Wärmereduction ist

¹⁾ Schlofskow. Studien d. phys. Instituts, Breslau 1865.

²⁾ Hirsch. Entwicklung der Fieberlehre. 1870.

³⁾ Ladendorf. Chinin und Variola. Differt. Rostock 1874.

⁴⁾ Manassein. Zur Lehre vom putriden Fieber. Centralblatt 1869.

⁵⁾ Binz. Arzneimittellehre 1877.

bedeutend. Nach den Zusammenstellungen von *Curvoisier*³⁾ beträgt der Abfall 0,7 — 1,2 — ja sogar 2—3° C. Der für die Antipyretica aufgestellte Satz, daß sie während der natürlichen Remission energischer als sonst wirken, hat auch hier seine volle Gültigkeit. Bei einem Fieber z. B. von mittlerer Intensität, wo also die Remission gewöhnlich gegen 8 Uhr Abends eintritt, kann man durch eine zu dieser Zeit verabreichte Chinindosis eine viel bedeutendere Temperaturabnahme erreichen, als wenn man dieselbe Gabe in den Vormittagsstunden nehmen läßt.

Salicylsäure. — Wirkt innerlich ganz so wie das Chinin, verdient somit neben das letztere gestellt zu werden. Ueber ihre antipyretische Bedeutung wurde schon viel geschrieben, jedoch läßt sich aus den gesammelten Abhandlungen nicht mit Bestimmtheit entnehmen, in welcher Weise dieses Mittel, die Reduction der Körperwärme zu Stande bringt. *Kolbe*⁴⁾ bewies, daß die Salicylsäure gährungshemmende Eigenschaften besitzt, woraus man wenigstens die prophylactische Wirkung ableiten könnte. *Binz*¹⁾ sagt: «Auf die verschiedensten Umsetzungs Vorgänge wirkt sie schon in sehr kleinen Gaben hindernd ein», was wohl auch zum Theil wenigstens, die Abnahme der allgemeinen Wärme erklären würde.

Von practischer Wichtigkeit sind die Mittheilungen von

³⁾ *Curvoisier*. Statistische Beiträge zur Symptomatologie und Therapie d. Typhs. abdom. 1875. Correspondenzblt. f. Schweizerärzte.

⁴⁾ *Kolbe*. Chemisches Centralblatt. 1874. Nr. 39 und 40.

¹⁾ *Binz*. Arzneimittellehre. 1877. p. 193.

*Johansen*¹⁾. Er verordnete die Salicylsäure vorzüglich bei Intermittens und Phthisis pulmonum, und gelangte schliesslich zu der Ueberzeugung, dass kleine Gaben nicht so prompt und sicher wirken wie Chinin. Andererseits sah er aber in vielen Fällen einen sehr günstigen Erfolg, darunter auch in solchen, wo Chinin nur vorübergehend das Fieber befeitigt hatte.

*Fürbinger*²⁾ fand, dass bei künstlich (durch subcutane Infection putrider Flüssigkeit) erzeugten septischem Fieber, die innerlich dargereicherte Salicylsäure — 0,05—2,0 pr. dosi — eine temperaturerniedrigende Wirkung hat, obwohl nicht ausnahmslos (unter 16 Fälle 13 Mal). Beim Entzündungsfieber und bei normalen Temperaturen waren jedoch die Resultate negativ. In Erwägung dessen, dass der Wärmeabfall meist unter profusem Schwitzen eintrat, nimmt *Fürbinger* an, derselbe sei überhaupt nur durch die starke Schweissabgabe bedingt. Dieser Auffassung tritt *Buys*³⁾ entschieden entgegen, indem er darauf hinweist, dass bedeutende Remissionen oft ohne gesteigerte Schweissabsonderung, oder lange vor einer solchen Steigerung zu Stande kommen, was unerklärlich wäre, wenn man die Salicylsäure blos als ein schweisstreibendes Mittel hinstellen wollte.

*Immermann*⁴⁾ behandelte fast 200 Patienten mit Sali-

¹⁾ Johansen. Ueber die antifebrile Wirkung der Salicylsäure. Inaug.-Dissert. Berlin 1875.

²⁾ Fürbinger. Zur Wirkung der Salicylsäure. Jena 1875.

³⁾ Buys. Zur antipyretischen Bedeutung der Salicylsäure etc. Stuttgart. 1876.

⁴⁾ Liebermeister. Handbuch der Pathologie und Therap. des Fiebers. Leipzig. 1875.

cyllsäure und spricht sich über die antipyretische Wirkung der letzteren folgendermassen aus: «Kleine Dosen sind ebenso wenig wirksam, wie kleine Chinindosen. Grosse Dosen von 4—6 Gramm, also etwa doppelt so gross wie die wirksamen Chinindosen sind vorzügliche antipyretica. Die Salicylsäure ist das vorzüglichste Antipyreticum, welches ich kenne, übertrifft bei gewissen Fieberformen das Chinin etc.» *Liebermeister* fügt hinzu: «Seit diesen Mittheilungen von *Immermann* habe ich in der hiesigen Klinik die Salicylsäure mit Erfolg bei Abdominaltyphus, Scharlach, Pneumonie, Pleuritis, Phthisis angewendet und dabei die Angaben von *Buys* und *Immermann* vollständig bestätigt gefunden. — Aehnliche Erfahrungen hat *Jürgensen* in der Kinderpraxis gemacht.

Buys (l. c.) gibt aus eigener Erfahrung an: «Die Salicylsäure ist als Antipyreticum mindestens von eben so sicherer Wirkung wie Chinin.»

Ganz besonders interessant ist die Beobachtung *Liebermeisters*, dafs bei vielen Fällen von Abdominaltyphus die Salicylsäure allein genügte, so dafs die Anwendung von Bädern nicht nöthig war.

Diesen schmeichelhaften Urtheilen über die antipyretische Wirksamkeit der Salicylsäure steht die Mittheilung von *Wolffberg*¹⁾ schroff entgegen. Nach seinen Untersuchungen ist die Salicylsäure nur in manchen Fällen im Stande, die Temperatur herabzusetzen und das nur auf kurze Zeit. —

In Bezug auf ihre Verwendbarkeit in der internen

¹⁾ Wolffberg. Ueber die antipyretische Bedeutung der Salicylsäure, Deutsch. Archv. f. klin. Medic. XVI, 2 S. 162 ff.

Therapie sind die Ansichten auch sehr verschieden. So betrachtet der soeben erwähnte Autor die Salicylsäure als Aetzmittel, welches «mit Sicherheit» MagenGeschwüre hervorruft, was jedoch andere, jedenfalls nicht minder berühmte Forscher vollkommen bestreiten. Diese Contraversen scheinen hauptsächlich von der Verschiedenheit der angewendeten Präparate abhängig zu sein. *Buys* sagt übrigens mit Recht: «Aus der ätzenden Einwirkung eines Körpers folgt einmal nicht im Entferntesten, daß derselbe nicht innerlich verabreicht werden dürfte.» Er verweist auf die Carbonsäure, welche doch unstreitbar eine bedeutend ätzende Wirkung hat, und dennoch gegen Eczeme bis auf 4,0 pro die (in Pillenform) verordnet wird. Die trockene Salicylsäure scheint durch Wasserentziehung auf die Gewebe schädlich zu wirken, wird sie aber in Wasser suspendirt, so ist dieser Einfluß nicht mehr zu befürchten. Ein Verhältniß von 1 Theil Salicylsäure auf 30 Theile Wasser soll genügen, um die schädliche Einwirkung zu verhindern.

In der Wirkung der freien Säure gleich, jedoch viel besser im Geschmack, und schneller resorbirbar, demnach also empfehlenswerther, ist das neutrale Salicylsäure Natron. Man verordnet es am besten im Wasser gelöst, mit Zusatz von *Natrum bicarbonicum* (2,0 Na. bic. auf 10 *Natr. salicyl.*) oder *succus Liquiritiae*.

Digitalis. Ihre temperatur- und pulsherabsetzende Eigenschaft wurde durch zahlreiche klinische Beobachtungen festgestellt. *Traube* hat die antipyretische Bedeutung dieses Mittels für die Therapie der fibrinösen Pneumonien nach-

gewiesen; *Wunderlich* gebrauchte es mit dem besten Erfolge beim Typhus abdom., bei der Pleuritis und Erysipelas.

Diese reducirende Wirkung auf die Körperwärme entfaltet jedoch die Digitalis erst dann, wenn sie in größeren Dosen (etwa 0,2 zweistündlich) dargereicht wird, während nach kleinen Gaben (etwa 0,006 innerlich) eher eine Steigerung der Pulsfrequenz und Körperwärme eintritt.

Die Verminderung der Pulsfrequenz, welche mittels kräftiger Dosen in jedem Fieber erzielt werden kann, erklärt *Traube*¹⁾ durch eine Reizung der Vagusenden (der peripheren oder centralen). Dafür spricht vor allem der physiologisch schon längst anerkannte Satz, daß nach jeder electricen, chemischen oder mechanischen Reizung eines Vagus die Herzcontractionen an Frequenz abnehmen. Dann wurde auch durch Experimente bewiesen, daß die Digitalis ihre Eigenschaft, die Pulsfrequenz zu vermindern, verliert, sobald man dem Versuchsthier vorher Atropin, also ein wie bekannt vaguslähmendes Mittel, eingespritzt.

Die Erniedrigung der Körperwärme ist von der Abnahme der Pulsfrequenz unabhängig. Der Temperaturabfall ist vielmehr nach *Heidenhain*²⁾ bedingt durch gesteigerten arteriellen Druck und hiedurch verstärkte Wärmeregulierung an der Körperoberfläche. Je lebhafter nämlich der Kreislauf, desto mehr Blut kommt in einer gewissen Zeiteinheit von den inneren Organen zur Körperoberfläche, desto größer

¹⁾ *Traube*. Gefammelte Beiträge z. Physiol. u. Pathl.

²⁾ *Heidenhain*. Ueber bisher unbeachtete Einwirkung des Nervensystems auf Temperatur u. Kreislauf. Pflügers Arch. Bd. III. u. V.

ist somit die Abkühlung an der letzteren, der Temperaturabfall überhaupt.

Der Einfluss auf Puls und Temperatur kann sich noch dann geltend machen, wenn das Medikament bereits ausgesetzt ist, indem ein Theil desselben im Kreislauf zurückbleibt. Durch diese Cumulativwirkung kann Lähmung des Herzens entstehen, als deren erstes Sympton Unregelmäßigkeit der Herzschläge (*Adynamia cordis*) auftritt. *Heidenhain* führt diese Arytmie auf eine Reizung der im Herzmuskel selbst eingebetteten Hämungsganglien zurück. Nach den von *Ackermann*¹⁾ angestellten Versuchen (an Thieren) endeten hohe Grade der Herzarythmie immer mit Tod. Es folgt hieraus die klinische Regel, dass man beim Gebrauche der *Digitalis* die Herzaction aufmerksam zu controliren hat, namentlich wenn der Kranke herabgekommen, heftig ist.

Dass die Siftirung der Herzbewegungen — die eigentliche Todesursache bei *Digitalis*-Intoxicationen —, auf einer grossen *Adynamie* des Herzmuskels beruht, unterliegt keinem Zweifel. *Binz*²⁾ sagt: »Giftige *Digitalis*gaben lähmen *Vagus* und Herzmuskel derart, dass sie selbst auf den »Inductionsstrom nicht mehr reagiren.«

Als ziemlich constante Wirkung der *Digitalis* ist noch hervorzuheben, die Verengerung der kleinen Arterien, wahrscheinlich bedingt durch Erregung des in der *Medulla oblongata* liegenden Vasomotorischen Centrums. Diese Ver-

¹⁾ *Ackermann*. Ueber die Wirkung der *Digitalis*. Sammlung klin. Vortg. Nr. 48.

²⁾ *Binz*, Arzneimittellehre. 1877.

engerung steigert den Blutdruck; der erhöhte Blutdruck aber muß seinerseits wieder den Vagus reizen.

Hiemit wären unsere Kenntnisse über die Wirkung der Digitalis erschöpft! Wir wissen, daß sie die Körperwärme herabsetzt, die Herzthätigkeit verlangsamte, somit die zwei gefährlichsten Symptome des Fiebers bekämpft. Trotzdem hat die Digitalis als antipyreticum keinen besonderen Ruf. Man wirft ihr vor, daß sie zu langsam ihre Wirkung entfaltet, so daß nicht selten erst nach 60 Stunden der Temperaturabfall beginnt; ferner, daß sie die Verdauung stark beeinträchtigt und endlich die Gefährlichkeit der cummulation einzelner Dosen, von welcher oben die Rede war. *Binz* macht noch ausserdem den Vorwurf, daß die Digitalis in Folge des bedeutend wechselnden Gehaltes der Blätter an wirksamen Körpern, unzuverlässig in der Dosirung ist. Es liesse sich dem vielleicht durch Anwendung des chemisch reinen Digitalins abhelfen?

Jedenfalls ist die Digitalis dann angezeigt, wenn durch andere Mittel eine Herabsetzung der Temperatur nicht erreicht wird, die Herzthätigkeit aber noch kräftig ist. In solchen hartnäckigen Fällen verbindet man die Digitalis zweckmässig mit Chinin und wenn es einmal gelungen ist, auf diese Weise eine vollständige Intermiffion zu erreichen, so gelingt es später auch durch das Chinin allein (Liebermeister.) Es scheint, daß das Zusammentreffen von verminderter Production der Wärme mit verstärkter Abfuhr derselben die Reduction erzwingt (*Binz.*)

Veratrum und Veratrin. *Vogt*¹⁾ war wohl der erste,

¹⁾ Vogt. Fieberunterdrückende Methode 1859.

welcher die antifebrile Wirkung der weissen Niefswurzel anerkannte. Seine Erfahrungen über die Wirksamkeit dieses Medikaments bei der Pneumonie wurden etwas später durch *Ritter*¹⁾ bestätigt.

Von den neueren klinischen Auffätzen verdient besonders die statistisch-kritische Abhandlung von *Kocher*²⁾ erwähnt zu werden, sowie auch die von *Sidlo*³⁾ an der Duchek'schen Klinik in Wien gemachten Erfahrungen.

Hauptbestandtheil ist das Veratrin, und nur dieses allein wird jetzt angewendet, während in den früheren Zeiten auch das Rhisoma Veratri gebraucht wurde. Dosis des Veratrins ist 1—4 Miligr.

Kocher (l. c.) fand, dass das Veratrin auf die Herzthätigkeit einen viel bedeutenderen Einfluss hat, als auf die Körperwärme. Nach *Liebermeister*⁴⁾ ist es ein sehr zuverlässiges Antipyreticum, wenn in genügender Dosis angewendet.

Die Reduction der allgemeinen Körperwärme beruht wahrscheinlich auf Zunahme des arteriellen Blutdruckes und dadurch bedingte Vermehrung der Wärmeabgabe. — Wenn der therapeutische Werth eines Arzneimittels durch die Mortalitätsstatistik der Krankheit, gegen welche dasselbe verordnet wird, bestimmt werden darf, so gebührt nach der Berechnung von *Kocher* und *Sidlo* dem Veratrin eine sehr

¹⁾ Ritter. Deutsche Klinik. 1860.

²⁾ Kocher. Behandlung der Pneumonie mit Veratrin etc. Würzburg 1866.

³⁾ Sidlo. Deutsches Archv. f. klin. Med. Bd. 14.

⁴⁾ Deutsch. Archv. f. klinisch. Medic. Bd. 14.

ehrbare Stellung bei der Therapie der Lungenentzündung. Der erste Autor hatte nämlich bei dieser Behandlung eine Mortalität von 10,9% der andere von 6,6%.

Ueber die physiologische Wirkung des Veratrins schrieben in den neueren Zeiten *Guttmann*¹⁾ und *v. Bezold und Hirt*.²⁾ Für *Guttmann* ist das Veratrin nur ein Muskelgift, welches zuerst andere Muskeln, dann aber auch den Herzmuskel angreift. Nach den beiden anderen Forschern ist das Veratrin ein directes Nervinum, welches in kleinen Gaben und im Beginn stark irritirend, bei etwas größeren Dosen aber lähmend einwirkt.

Diese physiologischen Ansichten und die klinisch festgestellte Thatfache, daß die Verlangsamung der Pulschläge weit nachdrücklicher und auch viel früher eintritt, als die Reduction der Körperwärme, weist darauf hin, daß die antipyretische Wirkung des Veratrins der der Digitalis ganz analog ist. Beide reduciren nämlich zuerst die Herzthätigkeit und erst dann — indirect — die Körperwärme.

Alkohol. Als Stimulans gegen asthenische Fieberaffectionen war der Alkohol schon von *John Brown* und seinen Schülern gebraucht; in den späteren Zeiten wurde jedoch dieses Mittel gänzlich obsolet. Ja, es gab sogar eine Zeitperiode, wo man bei fieberhaften Krankheiten jedes alkoholische Getränk als ungemein schädlich — weil temperaturerhöhend — betrachtete.

Dieser Anschauung traten zuerst einige englische Aerzte

¹⁾ *Guttmann*. Archv. f. Anatomie und Physiolog. 1866.

²⁾ *v. Bezold und Hirt*. Untersuchungen aus d. physiol. Labor. Würzb. 1867.

entgegen (*Todd, Beale, Sidney-Ringer* etc. etc.), nachdem sie durch eine große Reihe von Betrachtungen zur Ueberzeugung gelangten, daß der Alkohol entschieden die Wärme herabsetzt.

In Frankreich ist *Jaccoud*¹⁾ der größte Anhänger der Alkohol-Behandlung in fieberhaften Krankheiten. Nach diesem Forscher reducirt der Alkohol die Körperwärme in allen Fieberformen, am meisten jedoch in denen, welche mit einer ausgesprochenen Schwäche verbunden sind. *Collin* und *Marvaud* haben den Alkohol mit ausgezeichnetem Erfolge bei intermittirenden Fiebern gegeben.

In Deutschland giebt es jetzt auch sehr viele Aerzte, welche den Alkohol als Antipyreticum in Schutz nehmen. *Volkmann*²⁾ rühmt diese Therapie bei der Erysipelas, *Socin*³⁾ empfiehlt alkoholische Getränke gegen pyämische Fieber. Die zahlreichen Beobachtungen von *Riegel*⁴⁾ beweisen, daß der Alkohol sowohl beim gefunden Menschen, als auch in verschiedenen mit Fieber verbundenen Affectionen (Erysipelas, Pneumonie, Typh. abdom.) die Körpertemperatur um einige zehntel Grad herabzusetzen vermag. *F. Niemayer*⁵⁾ hat zuerst die Bemerkung gemacht, daß bei stark befoffenen Leuten die Körperwärme überhaupt bedeutend subnormal ist.

Diese Thatfache wurde nun in letzterer Zeit auch von

¹⁾ Jaccoud. Leçons faites à l'Hospital de la Charité. 1874.

²⁾ Volkmann. Handbuch d. Chirurgie v. Piltz u. Pillroth I. Bd.

³⁾ Socin, Kriegschirurgische Erfahrungen. Leipzig. 1811.

⁴⁾ Riegel. Deutsch. Archv. f. klin. Medic. Bd. XII. 1. 1873.

⁵⁾ F. Niemayer. Ueber Behandlung d. Corpulenz.

*Reinke*¹⁾ bestätigt. *Conrad*²⁾ berichtet über ausgezeichnete Erfolge des Alkohols beim Puerperalfieber. *Jürgensen*³⁾ rühmt besonders die excitirende Wirkung der alkoholischen Getränke in der Pneumonie.

Physiologisch wurde festgestellt, daß beim Gesunden der Alkohol in mäßigen Gaben auf die Körperwärme keinen Einfluss hat. Durch größere Gaben jedoch, falls keine Gewohnheit an solche vorliegt, wird die Innenwärme des Körpers durchschnittlich um 0,5 °C herabgesetzt. Die Abkühlung ist unabhängig von der Einwirkung auf die Bahnen des Centralnervensystems (*Binz.*)

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Reduction der Körperwärme so zu erklären, daß der Alkohol einerseits den Stoffumsatz im Allgemeinen herabsetzt, anderseits aber direct hemmend auf diejenigen Nerven einwirkt, welche der Wärmebildung vorstehen. Auch die Erweiterung der an der Körperoberfläche gelegenen Blutgefäße, und dadurch bedingte Steigerung der Verdunstung kommt in Betracht.

Die antipyretische Wirkung ist im Allgemeinen nicht von langer Dauer; dagegen tritt bei Fiebernden Berauschung selbst nach großen Dosen nicht ein. In einigen Fieberaffectionen z. B. im Wunderysipel, in der puerperalen Peritonitis, kann man durch Alkohol auch danu noch einen deutlichen Temperaturabfall schaffen, wenn selbst hohe Chiningaben erfolglos blieben. Sogar im hectischen Fieber

¹⁾ Reinke. Deutsch. Archv. f. klin. Medic. Bd. XVI. 1875.

²⁾ Conrad. Ueber Alkohol- und Chininbehandlung des Puerperalfiebers. Bern 1875.

³⁾ Jürgensen. Grundsätze f. Behandlung der croupösen Pneumonie. Volkmanns Sammlg. klinisch. Vorträge. Nr. 45.

der Lungenphthise geht nach 40—80 Cem. absoluten Alkohols die Temperatur etwas herab (*G. Strafsburg, Brchmer*).

Blutentziehung. Zuletzt will ich noch einiges berichten, über die Rolle, welche heutzutage die Blutentziehung bei der antifebrilen Therapie spielt.

Vor etwa 60 Jahren glaubte man noch, der Aderlaß sei eines der besten Mittel gegen fieberhafte Affectionen. *Hufeland's* Ansichten in dieser Beziehung waren ungefähr folgende:

»Das Leben des Menschen liegt in seinem Blute, dieses letztere hat somit ein selbständiges Leben. Beim Fieber entwickelt sich im Blute sogar ein Ueberfluß der Vitalität und diesen Ueberfluß muß man durch eine Blutentziehung ausgleichen.«

In unseren Zeiten haben *Traube* und *Virchow* für den Aderlaß als Antipyreticum eine lange Zeit plaidirt. *Traube* rieth namentlich zu Ader zu lassen, unmittelbar vor dem critischen Temperaturabfall, wodurch letzterer viel ergiebiger und nachhaltiger werden soll. *Virchow* hofft durch den Aderlaß deshalb eine Wärmerniedrigung zu erzielen, weil der erstere neben seiner ableitenden Wirkung auch die »Athmungsubstanz« vermindert.

Dafs nach allgemeinen Blutverlusten die Körperwärme sowohl bei vorher Gefunden, wie auch bei Fiebernden sinkt, ist eine allgemein bekannte und anerkannte Thatfache. Die Untersuchungen jedoch von *Bergmann*²⁾ und *Frefse*³⁾

¹⁾ Hufeland, Bd. XLVI. 1818.

²⁾ Bergmann, Virchow's Archiv. 1867.

³⁾ Frefse, Centralblatt. 1867.

haben zur Genüge dargethan, daß die Abnahme der Körperwärme nur eine vorübergehende ist und daß gleich darauf eine noch bedeutendere Steigerung derselben folgt. Nach dem einstimmigen Urtheile dieser beiden Forscher ist die nachfolgende Temperatursteigerung so zu erklären: In Folge plötzlicher Entleerung der Blutgefäße gelangen Zersetzungsprodukte in das Blut und wirken hier fiebererregend.

In physiologischer Beziehung will ich noch der Experimente erwähnen, welche *Nawrocki* in Warschau vornahm. Dieselben waren zwar nicht mit Rücksicht auf das uns hier beschäftigende Thema angestellt, könnten jedoch meines Erachtens vielleicht einiges Licht auf dasselbe werfen. *Nawrocki*¹⁾ fand nämlich, daß eine Steigerung des Blutdruckes den Tonus der Vagi steigert, somit auch den Puls verlangsamte und daß umgekehrt bei einer Verminderung des Blutdruckes der Tonus geringer, der Puls frequenter wird. Nun würde schon die Verlangsamung der Herzthätigkeit allein genügen, um die Körperwärme herabzusetzen; außerdem steht aber noch die Frage offen, ob eine Erregung der Vagi nicht noch in anderer Weise auf die allgemeine Temperatur reducirend einwirken könnte.

Deffen ungeachtet macht sich jetzt die Meinung immer mehr geltend, daß der Blutentziehung nur eine antiphlogistische und antiphlogistische, nicht aber zugleich eine antipyretische Wirkung zuzuschreiben sei.

¹⁾ Nawrocki Feliks. »O Wplywie cisnienia krwi na centr nerwu blednego« *Gazeta Lekarska*. Warszawa. 1870.

